

Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej

2-3 dni przed badaniem:

- Stosuj dietę lekkostrawną, z wyłączeniem surowych jarzyn, owoców i ciemnego pieczywa, unikaj potraw ciężkostrawnych i produktów wzdymających, takich jak fasola, groch, kapusta, cebula, nie spożywaj alkoholu i napojów gazowanych. Należy przyjmować codziennie leki zmniejszające ilość gazów jelitowych, np. Symetykon lub Dimetykon, zgodnie z zaleceniami lekarza lub informacją dostępną w ulotce. . Lek można kupić w aptece bez recepty.

W dniu badania :

5-6 godzin przed badaniem:

- Nie przyjmuj pokarmów.
- Nie pij żadnych płynów poza niesłodzoną wodą niegazowaną, w szczególności nie pij kawy i mocnej herbaty.
- Nie pal tytoniu.
- Nie żuj gumy.
- Zadbaj o wypróżnienie.

1-2 godziny przed badaniem:

- wypij ok. 0,5 l. wody niegazowanej i nie oddawaj moczu (ilość wypitego płynu potrzebna do wypełnienia pęcherza jest zależna od czynników indywidualnych- wypełnij pęcherz w taki sposób , aby był średnio wypełniony, ale nie maksymalnie).

W dniu badania należy przyjąć leki, które regularnie przyjmujemy.

Proszę zabrać ze sobą wyniki badań usg brzucha, jeśli były wykonywane wcześniej.